

DOSE ED EPOCA DI IMPIEGO

Coltura	Epoca impiego	N° trattamenti	L/ha acqua	Formulato L/ha	Note
Asparago	pre emergenza	1	300-500	0,6 – 0,7	impiegare su asparagiaie di almeno due anni
Carota	post emergenza	1	300-500	0,3 – 0,4	intervenire a partire dallo stadio di tre foglie vere
Patata	pre emergenza	1	300-500	0,3 – 0,45	usare la dose minore nei terreni limosi, e quella maggiore nei terreni argillosi, escludere l'impiego nei terreni sabbiosi
	post emergenza	1	300-500	0,35	intervenire a partire dallo stadio di due foglie vere fino a inizio fioritura
Pomodoro	pre semina o pre trapianto	1	300-500	0,35	intervenire 7 – 14 giorni prima della semina o del trapianto senza interrare
	trattamento di post emergenza o post trapianto	1	300-500	0,35 – 0,45	intervenire dopo il diradamento o il superamento della crisi di trapianto, su piante allo stadio di almeno otto foglie vere fino a inizio fioritura. Usare la dose minore su terreni limosi e la dose maggiore su terreni argillosi
Soia	pre emergenza o pre semina	1	300-500	0,35	Non impiegare su terreni sabbiosi o torbosi