

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella):

Coltura	Malattia	Dose ml/hl	Dose l/ha	Intervallo tra i tratt. (giorni)	N° massimo tratt. all'anno
Pomodoro in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), alternariosi (<i>Alternaria solani</i>)	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Patata in pieno campo	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), alternariosi (<i>Alternaria solani</i>)	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Cetriolo, cetriolino e zucchini in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Cetriolo, cetriolino e zucchini (in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	250	2,5	7-8	3
Melone in pieno campo	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), alternariosi (<i>Alternaria cucumerina</i> , <i>Alternaria alternata</i> , <i>Alternaria spp.</i>),	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Lattuga (Lactuca sativa) incluso Lattuga baby leaf in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	200	2	7-10	3
Cipolla e scalogno in pieno campo	<i>Peronospora (Peronospora destructor)</i>	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Aglione in pieno campo	<i>Peronospora (Peronospora destructor)</i> Ruggine (<i>Puccinia Allii</i>)	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Porro in pieno campo	Peronospora (<i>Phytophthora porri</i>)	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Erbe fresche in pieno campo	Peronospora (<i>Peronospora spp.</i>)	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Spinaci, bietola da foglia e da costa in pieno campo	Peronospora (<i>Peronospora spp.</i>)	200-250	2 – 2,5	7-10	3
Carciofo pieno campo	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>) Ascochitosi (<i>Ascochyta hortorum</i>) Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	250	2,5	7-10	3
Melanzana pieno campo e serra	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	250	2,5	7-10	3